

Checklist of the Birds of Finca El Pilar

San Cristóbal El Bajo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez

| No. | Order (Orden) | Family (Familia) | English name (Nombre en inglés) | Scientific name (Nombre Técnico) | Altitude masl (Altitud msnm) | Regional endemic (Endémico regional) |
|-----|----------------|------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Galliformes | Cracidae | Highland Guan | <i>Penelopina nigra</i> | 1800 - 2600 msnm | X |
| 2 | | Odontopharidae | Buffy crowned wood partridge | <i>Dendrortyx leucophrys</i> | 2000 - 2400 msnm | |
| 3 | | | Ocellated Quail | <i>Cyrtonyx ocellatus</i> | 2000 - 2600 msnm | X |
| 4 | | | Singing Quail | <i>Dactylortyx thoracicus</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 5 | Falconiformes | Cathartidae | Black Vulture | <i>Coragyps atratus</i> | 1700 msnm | |
| 6 | | | Turkey Vulture | <i>Cathartes aura</i> | 1700 - 2650 msnm | |
| 7 | | Accipitridae | Sharp-shinned Hawk (White-breasted Hawk) | <i>Accipiter striatus (A. chionogaster)</i> | 1700 - 2650 msnm | |
| 8 | | | Cooper's Hawk | <i>Accipiter cooperii</i> | 2000 msnm | |
| 9 | | | Broad winged Hawk | <i>Buteo platypterus</i> | 2000 msnm | |
| 10 | | | Red tailed Hawk | <i>Buteo jamaicensis</i> | 1700 - 2650 msnm | |
| 11 | | Falconidae | Laughing Falcon | <i>Herpetotheres cachinnans</i> | 1700 - 2650 msnm | |
| 12 | | | American Kestrel | <i>Falco sparverius</i> | 1700 msnm | |
| 13 | | | Peregrine Falcon | <i>Falco peregrinus</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 14 | Columbiformes | Columbidae | Rock pigeon | <i>Columba livia (introduced)</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 15 | | | Band tailed pigeon | <i>Patagioneas fasciata</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 16 | | | White-winged dove | <i>Zenaida asiatica</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 17 | | | Mourning dove | <i>Zenaida macroura</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 18 | | | Inca Dove | <i>Columbina inca</i> | 1700 - 2650 msnm | |
| 19 | | | Common ground dove | <i>Columbina passerina</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 20 | | | Maroon-chested Ground-dove | <i>Claravis monetoura</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 21 | | | White tipped dove | <i>Leptotila verreauxi</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 22 | | | White faced Quail Dove | <i>Geotrygon albifacies</i> | 2000 msnm | |
| 23 | Psittaciformes | Psittacidae | Barred parakeet | <i>Bolborhynchus lineola</i> | 2000 - 2400 msnm | |
| 24 | | | Green parakeet (Pacific parakeet) | <i>Aratinga holochlora strenua</i> | 2400 - 2650 msnm | X |
| 25 | Cuculiformes | Cuculidae | Squirrel Cuckoo | <i>Piaya cayana</i> | 1700 - 2000 msnm | |
| 26 | | | Lesser roadrunner | <i>Geococcyx velox</i> | 1700 - 1900 msnm | |
| 27 | | Tytonidae | Barn Owl | <i>Tyto alba</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 28 | | | Whiskered Screech-Owl | <i>Megascops trichopsis</i> | 1700 - 2600 msnm | |

| No. | Order (Orden) | Family (Familia) | English name (Nombre en inglés) | Scientific name (Nombre Técnico) | Altitude masl (Altitud msnm) | Regional endemic (Endémico regional) |
|-----|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 29 | Strigiformes | Strigidae | Great Horned Owl | <i>Bubo virginianus</i> | 2000 - 2650 msnm | |
| 30 | | | Mountain Pygmy-Owl | <i>Glaucidium gnoma</i> | 1700 - 2600 msnm | |
| 31 | | | Ferruginous Pygmy-Owl | <i>Glaucidium brasilianum</i> | 1700 - 2000 msnm | |
| 32 | | | Fulvous Owl | <i>Strix fulvescens</i> | 1700 - 2650 msnm | X |
| 33 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Common Nighthawk | <i>Chordeiles minor</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 34 | | | Whip-poor-will | <i>Caprimulgus vociferus</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 35 | Apodiformes | Apodidae | Black Swift | <i>Cypseloides niger</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 36 | | | Vaux's Swift | <i>Chaetura vauxi</i> | 1700 - 2000 msnm | |
| 37 | | | White collared Swift | <i>Streptoprocne zonaris</i> | 1700 - 2000 msnm | |
| 38 | | | White-throated Swift | <i>Aeronautes saxatalis</i> | 1700 - 2600 msnm | |
| 39 | | Rufous Sabrewing | <i>Campylopterus rufus</i> | 1700 - 2400 msnm | X | |
| 40 | | Violet Sabrewing | <i>Campylopterus hemileucurus</i> | 1700 - 2400 msnm | | |
| 41 | | Green Violet-ear | <i>Colibri thalassinus</i> | 1700 - 2400 msnm | | |
| 42 | | Blue-Throated Sapphire (Goldentail) | <i>Hylocharis eliciae</i> | 1700 - 2400 msnm | | |
| 43 | | White-eared Hummingbird | <i>Hylocharis leucotis</i> | 1700 - 2400 msnm | | |
| 44 | | Azure-Crowned Humminbird | <i>Amazilia cyanocephala</i> | 1700 - 2400 msnm | | |
| 45 | | Berylline Hummingbird | <i>Amazilia beryllina</i> | 1700 - 2400 msnm | | |
| 46 | | Green-throated Mountain-gem | <i>Lampornis viridipallens</i> | 1700 - 2400 msnm | X | |
| 47 | | Amethyst-throated Mountain-gem | <i>Lampornis amethystinus</i> | 1700 - 2600 msnm | | |
| 48 | | Magnificent Hummingbird | <i>Eugenes fulgens</i> | 1700 - 2400 msnm | | |
| 49 | | Slender Sheartail | <i>Doricha enicura</i> | 1700 - 2400 msnm | X | |
| 50 | | Ruby-throated Hummingbird | <i>Archilochus colubris</i> | 1700 - 2400 msnm | | |
| 51 | Trogoniformes | Trogonidae | Collared trogon | <i>Trogon collaris</i> | 1700 -2400 msnm | |
| 52 | Coraciiformes | Momotidae | Blue -Throated Motmot | <i>Aspatha gularis</i> | 2000 -2650 msnm | X |
| 53 | | Alcedinidae | Belted Kingfisher | <i>Ceryle alcyon</i> | 1750 msnm | |
| 54 | Piciformes | Ramphastidae | Emerald toucanet | <i>Aulacorhynchus prasinus</i> | 1800 - 2650 msnm | |
| 55 | | Picidae | Acorn Woodpecker | <i>Melanerpes formicivorus</i> | 1800 - 2650 msnm | |
| 56 | | | Golden-fronted Woodpecker | <i>Melanerpes aurifrons</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 57 | | | Golden-olive Woodpecker | <i>Piculus rubiginosus</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 58 | | | Yellow bellied Sapsucker | <i>Sphyrapicus varius</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 59 | Hairy Woodpecker | <i>Picoides villosus</i> | 1700 - 2400 msnm | | | |

| No. | Order (Orden) | Family (Familia) | English name (Nombre en inglés) | Scientific name (Nombre Técnico) | Altitude masl (Altitud msnm) | Regional endemic (Endémico regional) |
|-----|---------------------------|----------------------|--|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 60 | | | Northern Flicker | <i>Colaptes auratus</i> | 1700 - 2400 msnm | |
| 61 | | Furnariidae | Ruddy-Foliage-Gleaner | <i>Automolus rubiginosus</i> | 1800 - 2650 msnm | |
| 62 | Olivaceous Woodcreeper | | <i>Sittasomus griseicapillus</i> | 2000 - 2400 msnm | | |
| 63 | Strong Billed Woodcreeper | | <i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i> | 1800 - 2650 msnm | | |
| 64 | Spotted Woodcreeper | | <i>Xiphorhynchus erythrogygius</i> | 1800 - 2000 msnm | | |
| 65 | Spot-crowned Woodcreeper | | <i>Lepidocolaptes affinis</i> | 1800 - 2400 msnm | | |
| 66 | | Formicariidae | Scaled Antpitta | <i>Grallaria guatemalensis</i> | 2400 - 2650 msnm | |
| 67 | | Tyrannidae | Tufted Flycatcher | <i>Mitrephanes phaeocercus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 68 | | | Olive-Sided Flycatcher | <i>Contopus cooperi</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 69 | | | Greater Peewee | <i>Contopus pertinax</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 70 | | | Hammond's Flycatcher | <i>Empidonax hammondi</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 71 | | | Buff Breasted Flycatcher | <i>Empidonax fulvifrons</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 72 | | | Yellowish Flycatcher | <i>Empidonax flavescens</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 73 | | | Pine Flycatcher | <i>Empidonax affinis</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 74 | | | Dusky-capped Flycatcher | <i>Myiarchus tuberculifer</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 75 | | | Boat-billed Flycatcher | <i>Megarynchus pitangua</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 76 | | | Streaked Flycatcher | <i>Myiodynastes maculatus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 77 | | | Western Kingbird | <i>Tyrannus verticalis</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 78 | | | Genera INCERTAE SEDIS | Grey-collared Becard | <i>Pachyramphus major</i> | 1800 - 2000 msnm |
| 79 | | Rose-throated Becard | | <i>Pachyramphus aglaiae</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 80 | | Vireonidae | Bell's vireo | <i>Vireo bellii</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 81 | | | Plumbeous Vireo | <i>Vireo plumbeus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 82 | | | Blue-headed Vireo | <i>Vireo solitarius</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 83 | | | Brown-capped Vireo | <i>Vireo leucophrys</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 84 | | | Hutton's vireo | <i>Vireo huttoni</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 85 | | | Chestnut-sided Shrike-vireo | <i>Vireolanius melitophrys</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 86 | | | Rufous-browed Peppershrike | <i>Cyclarhis gujanensis</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 87 | | Corvidae | Bushy-crested Jay | <i>Cyanocorax melanocyaneus</i> | 1800 - 2000 msnm | X |
| 88 | | | Steller's Jay | <i>Cyanocitta stelleri</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 89 | | Hirundinidae | Violet-green Swallow | <i>Tachycineta thalassina</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 90 | | | Black-capped Swallow | <i>Notiochelidon pileata</i> | 1800 - 2000 msnm | X |

| No. | Order (Orden) | Family (Familia) | English name (Nombre en inglés) | Scientific name (Nombre Técnico) | Altitude masl (Altitud msnm) | Regional endemic (Endémico regional) |
|-----|----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 91 | Passeriformes | | Cave Swallow | <i>Petrochelidon fulva</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 92 | | Aegithalidae | Bushtit | <i>Psaltriparus minimus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 93 | | Troglodytidae | Band-backed Wren | <i>Campylorhynchus zonatus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 94 | | | Spot-Breasted Wren | <i>Thryothorus maculipectus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 95 | | | Rufous-and-white Wren | <i>Thryothorus rufalbus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 96 | | | Plain Wren | <i>Thryothorus modestus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 97 | | | Southern House-wren | <i>Troglodytes aedon</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 98 | | | Rufous-browed Wren | <i>Troglodytes rufociliatus</i> | 1800 - 2000 msnm | X |
| 99 | | | Grey-breasted Wood-wren | <i>Henicorhina leucophrys</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 100 | | Sylviidae | White-lored Gnatcatcher | <i>Poliotilta albiloris</i> | 1800 -2000 msnm | |
| 101 | | Turdidae | Eastern Bluebird | <i>Sialis sialis</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 102 | | | Brown-backed Solitaire | <i>Myadestes occidentalis</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 103 | | | Orange-billed Nightingale Thrush | <i>Catharus aurantirostris</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 104 | | | Hermit Trush | <i>Catharus guttatus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 105 | | | Swainson's Thrush | <i>Catharus ustulatus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 106 | | | Wood Thrush | <i>Hylocichla mustelina</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 107 | | | Black Thrush | <i>Turdus infuscatus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 108 | | | Clay-coloured Robin | <i>Turdus grayi</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 109 | | | Rufous-collared Thrush | <i>Turdus rufitorques</i> | 1800 - 2000 msnm | X |
| 110 | | Mimidae | Blue-and-white Mockingbird | <i>Melanotis hypoleucus</i> | 1800 - 2400 msnm | X |
| 111 | | | Tropical Mockingbird | <i>Mimus gilvus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 112 | Ptilonotidae | Gray Silky-Flycatcher | <i>Ptilonotus cinereus</i> | 1800 - 2200 msnm | | |
| 113 | Peucedramidae | Olive Warbler | <i>Peucedramus taeniatus</i> | 1800 - 2000 msnm | | |
| 114 | | Blue-winged Warbler | <i>Vermivora pinus</i> | 1800 - 2200 msnm | | |
| 115 | | Tennessee Warbler | <i>Vermivora peregrina</i> | 1800 - 2200 msnm | | |
| 116 | | Nashville Warbler | <i>Vermivora ruficapilla</i> | 1800 - 2200 msnm | | |
| 117 | | Orange crowned Warbler | <i>Vermivora celata</i> | 1800 - 2200 msnm | | |
| 118 | | Crescent-chested Warbler | <i>Parula superciliosa</i> | 1800 - 2200 msnm | | |
| 119 | | Yellow Warbler | <i>Dendroica petechia</i> | 1800 - 2200 msnm | | |
| 120 | | Black-throated Green Warbler | <i>Dendroica virens</i> | 1800 - 2200 msnm | | |
| 121 | | Townsend's Warbler | <i>Dendroica townsendi</i> | 1800 - 2200 msnm | | |

| No. | Order (Orden) | Family (Familia) | English name (Nombre en inglés) | Scientific name (Nombre Técnico) | Altitude masl (Altitud msnm) | Regional endemic (Endémico regional) |
|-----|---------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 122 | | Parulidae | Hermit Warbler | <i>Dendroica occidentalis</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 123 | | | Blackburnian Warbler | <i>Dendroica fusca</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 124 | | | Black-and-White Warbler | <i>Mniotilta varia</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 125 | | | Worm-eating Warbler | <i>Helmitheros vermivorum</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 126 | | | Ovenbird | <i>Seiurus aurocapillus</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 127 | | | MacGillivray's Warbler | <i>Oporornis tolmiei</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 128 | | | Common yellowthroat | <i>Geothlypis trichas</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 129 | | | Rufous capped Warbler | <i>Basileuterus rufifrons</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 130 | | | Canadian Warbler | <i>Wilsonia canadensis</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 131 | | | Wilson's Warbler | <i>Wilsonia pusilla</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 132 | | | Red faced Warbler | <i>Cardelina rubrifrons</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 133 | | | Painted redstart | <i>Myioborus pictus</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 134 | | | Slate-throated Redstart | <i>Myioborus miniatus</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 135 | | | Golden-browed Warbler | <i>Basileuterus belli</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 136 | | | Golden-crowned Warbler | <i>Basileuterus culicivorus</i> | 1800 - 2200 msnm | |
| 137 | | | Thraupidae | Flame-coloured Tanager | <i>Piranga bidentata</i> | 1800 - 2000 msnm |
| 138 | | White-winged Tanager | | <i>Piranga leucoptera</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 139 | | Summer Tanager | | <i>Piranga rubra</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 140 | | Western Tanager | | <i>Piranga ludoviciana</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 141 | | Emberizidae | White-collared Seedeater | <i>Sporophila torqueola</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 142 | | | White-naped Brush-Finch | <i>Atlapetes albinucha</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 143 | | | Chestnut-capped Brush Finch | <i>Arremon brunneinucha</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 144 | | | White-eared Ground-sparrow | <i>Melospiza leucotis</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 145 | | | Prevost's Ground Sparrow | <i>Melospiza biarcuata</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 146 | | | Spotted Towhee | <i>Pipilo maculatus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 147 | | | Stripe-Headed Sparrow | <i>Aimophila ruficauda</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 148 | | | Rufous-collared Sparrow | <i>Zonotrichia capensis</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 149 | | Cardinalidae | Rose breasted Grosebeak | <i>Pheucticus ludovicianus</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 150 | | | Yellow Grosbeak | <i>Pheucticus chrysopeplus</i> | 1700 msnm | |
| 151 | | | Indigo bunting | <i>Passerina cyanea</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 152 | | | Blue rumped Euphonia | <i>Euphonia elegantissima</i> | 1800 - 2000 msnm | |

| No. | Order (Orden) | Family (Familia) | English name (Nombre en inglés) | Scientific name (Nombre Técnico) | Altitude masl (Altitud msnm) | Regional endemic (Endémico regional) |
|-----|---------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 153 | | Fringillidae | Black-headed Siskin | <i>Carduelis notata</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 154 | | | American goldfinch | <i>Carduelis tristis</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 155 | | | Lesser Goldfinch | <i>Carduelis psaltria</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 156 | | | Hooded grosebeak | <i>Coccothraustes abeillei</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 157 | | Icteridae | Great-tailed Grackle | <i>Quiscalus mexicanus</i> | 1700 msnm | |
| 158 | | | Bronzed Cowbird | <i>Molothrus aeneus</i> | 1700 msnm | |
| 159 | | | Bar-winged Oriole | <i>Icterus maculialatus</i> | 1800 - 2000 msnm | X |
| 160 | | | Black-vented Oriole | <i>Icterus wagleri</i> | 1800 - 2000 msnm | |
| 161 | | | Baltimore Oriole | <i>Icterus galbula</i> | 1800 - 2000 msnm | |

| Statistics / Estadísticas | |
|---------------------------|----------------------|
| 12 | Ordenes |
| 38 | Familias |
| 161 | Especies |
| 14 | Endemicas regionales |